



КАДВАН®

дієтична добавка

Біоактивна форма вітаміну K2 (менахіон МК-7)

• Для зміцнення кісткової тканини • Для захисту судин, серця, мозку •

Склад: 1 м'яка желатинова капсула містить: основна речовина: вітамін K2 (менахіон МК-7) – 45 μg (мкг); допоміжні речовини: МСТ олія (середньоланцюгові тригліцериди), зволожувач: гліцерин; оболонка капсули: желатин.

Властивості основної речовини:

Вітамін K2 – жиророзчинний вітамін, який, на відміну від низки жиророзчинних поживних речовин, накопичується печінкою в обмеженій кількості. Тому організм для нормального функціонування потребує його щоденного додаткового забезпечення з харчовими продуктами (природно ферментовані, як-от квашена капуста, деякі види твердих сирів, сиров'яленого м'яса) або з дієтичними добавками.

Вітамін K2 є ключовим елементом в активації K2-залежних білків, зокрема остеокальцину та матричного білка (такі білки синтезуються в організмі за участі вітаміну D3), які допомагають підтримати та захистити кісткову тканину, сітківку ока, судинну стінку, серцеві клапани.

Регулярне вживання вітаміну K2 сприяє:

- зміцненню кісток. При менопаузі втрата кісткової маси пришвидшується, тому жінкам в цей період особливо важливо підтримувати необхідний рівень надходження вітаміну K2 для доставки кальцію до кісткової тканини та його утримання у кістках. Це дає можливість протидії розвитку остеопенії, остеопору та зниження ризику переломів.
- зниженню ризику розвитку негативних серцево-судинних подій (як-от інфаркт або інсульт). Вітамін K2 допомагає запобігти кальцифікації (відкладенню кальцію) капілярів сітківки ока, кровоносних судин, серцевих клапанів, чим сприяє збереженню їхньої еластичності.
- покращенню метаболізму глюкози. Вітамін K2 бере участь в активації поглинання глюкози м'язовими клітинами та стимуляції експресії інсуліну.
- запобіганню утворення зморшок шкіри. Вітамін K2 запобігає накопиченню надлишку кальцію в шкірі, внаслідок чого формуються перепони до утворення зморшок.

Забезпеченість організму людини вітаміном K2 залежить від стану шлунково-кишкового тракту, бо певна кількість виробляється у товстій кишці. Широке розповсюдження кишкового дисбіозу, прийом антибіотиків, хіміотерапія, нераціональне харчування, хронічні захворювання кишківника є основними причинами дефіциту вітаміну K2.

Вітамін K2 існує у декількох хімічних формах. Серед цих форм саме менахіон МК-7 має високий рівень засвоюваності, забезпечує кращий та більш тривалий рівень концентрації в крові, що важливо для корекції дефіциту (недостатності) вітаміну K2.

Рекомендації щодо застосування:

«КАДВАН®» рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону як додаткове джерело вітаміну К2 (менахінону МК-7) з метою забезпечення його достатнього рівня в організмі та протидії ризикам, що супроводжують дефіцит цього нутрієнта. Прийом «КАДВАН®» рекомендований:

- для підтримки відновлення кісткової тканини після перенесених травм та переломів;
- для протидії розвитку остеопенії та остеопорозу;
- для протидії накопиченню кальцію в капілярах сітківки ока, в стінках судин, серцевих клапанах та в інших внутрішніх органах, м'яких тканинах та шкірі;
- для протидії кровотечам, геморагіям та гематомам на фоні прийому лікарських засобів антикоагулянтної дії.

Спосіб застосування та рекомендована добова кількість:

З метою усунення дефіциту вітаміну К2 вживати дорослим по 1 м'якій капсулі на добу під час їди. Мінімальний курс споживання – 1 місяць.

За рекомендацією лікаря рекомендована добова кількість та необхідна тривалість споживання можуть бути змінені індивідуально.

Застереження:

- Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
- Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
- Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
- У випадку прийому лікарських засобів на основі орлістату слід пам'ятати, що вживання вітаміну К2 рекомендоване не раніше, ніж через 2 години після прийому орлістату.
- Одночасне вживання вітаміну К2 та варфарину може знизити ефективність застосування останнього.
- Не вживати при індивідуальній непереносимості компонентів, під час вагітності або у період лактації.

Форма випуску: м'які желатинові капсули №30 у блістері та у картонній паці.

Маса нетто 1 м'якої капсули: 280 mg (mg) $\pm$ 10 %.

Строк придатності: 2 роки.

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 15 °C до 25 °C у захищеному від світла, вологості та недоступному для дітей місці.

Вироблено на замовлення:

ТОВ «ОМНІФАРМА ЕСТОНІЯ»,
Тартуське шосе, 25-7, повіт Гар'юмаа,
район Кесклін, Таллінн, 10117,
Естонська Республіка.

Вироблено в Євросоюзі



Виробник: ТОВ «Олеофарм»,
вул. Мокроноська, 8, Вроцлав, 52-407, Польща.
Імпортер в Україні: ТОВ «Актіфарм»,
вул. Мишуги Олександра, буд. 10, офіс 212,
м. Київ, 02141, Україна; тел.: +38 (044) 377-51-14.
